

Llawdriniaeth Mastoid

Llawdriniaeth Mastoid:

Mae llawdriniaeth Mastoid yn golygu tynnu clefyd oddi ar yr asgwrn mastoid sydd ychydig y tu ôl i'r glust. Mae yna wahanol fathau o lawdriniaethau mastoid y gellir eu perfformio yn ôl natur y clefyd sy'n bresennol. Mae'r mathau cyffredin o lawdriniaeth mastoid yn cynnwys:

- mastoidectomi cortigol
- Mastoidectomi radical wedi'i addasu
- mastoidectomi radical
- Tympanoplasti ymagwedd gyfunol
- Aticotomi

Mae yna ddau fath cyffredin o glwyfau llawfeddygol o ran llawdriniaeth mastoid. Mae'r rhain yn cynnwys blaen-glustioli (clwyf o flaen y glust) a'r ôl-glustioli (clwyf y tu ôl i'r glust). Bydd gan gleifion rhwymyn pen ar ôl y llawdriniaeth. Cyn rhyddhau o'r ysbyty, bydd y tîm meddygol yn tynnu'r rhwymyn pen. Ar yr adeg yma bydd y clwyf yn cael ei wirio am unrhyw broblemau.

Os mai fel claf allanol gawsoch y llawdriniaeth, cewch gyngor ar sut i gael gwared ar y rhwymyn eich hun y diwrnod canlynol.

Fe'ch hysbysir os oes gennych chi bwythau y gellir eu toddi neu os nad yw'ch pwythau'n toddi a bod angen eu tynnu. Gall eich nyrs practis meddyg teulu dynnu pwythau (fel arfer 6-10 diwrnod ar ôl llawdriniaeth). Bydd angen i chi wneud apwyntiad gyda'ch nyrs practis meddyg teulu er mwyn trefnu hyn.

Mae'n bwysig cadw'r glust yn sych wedi'r llawdriniaeth. Yn arbennig felly, osgowch olchi gwallt nes bod y pwythau wedi'u tynnu. Efallai yr hoffech roi cynnig ar siampŵ sych os yw eich gwallt yn teimlo'n seimllyd. Mae'n bwysig hefyd cadw corn y glust yn sych wedi llawdriniaeth (hyd nes y bydd y llawfeddyg yn dweud wrthy'ch fel arall) drwy ddefnyddio darn o wllân cotwm wedi'i orchuddio mewn Vaseline pan yn y bath/cawod. Peidiwch â rhoi eich pen dan ddŵr.

Pe bai eich clwyf yn chwyddo neu'n dechrau agor wedi'r llawdriniaeth, bydd angen i chi cael eich gweld gan yr ystafell driniaeth Clust, Trwyn a Gwddf (ENT) neu'ch Meddyg Teulu. Mae manylion cyswllt yr ystafell driniaeth ENT ar y daflen hon.

Pecyn corn y glust:

Fel arfer, gosodir pecyn yng nghorn y glust wedi'r llawdriniaeth er mwyn dâl y grafft yn ei le ac i leihau'r risg o haint. Y math o becyn mwyaf cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio yw 'BIPP' (rhwyllen rhuban wedi'i gwlychu mewn past paraffin iodine bismuth) sy'n lliw melyn. Yn aml, defnyddir mwy nag un pecyn. Bydd y pecyn hwn yn cael ei dynnu mewn clinig oddeutu 3 wythnos wedi'r llawdriniaeth fel arfer. Ambell waith gall ymateb alergaidd i becyn 'BIPP' ddigwydd. Fel arfer bydd hyn yn amlwg ar ffurf chwyddo a phoen o gwmpas corn y glust. Os yw hyn yn digwydd, cysylltwch â'r ystafell driniaeth ENT/eich ward derbyn er mwyn trefnu i'r glust gael ei asesu gan y meddyg ENT sydd ar alwad.

Efallai y bydd angen tynnu'r pecyn 'BIPP' ynghyd â rhoi pecyn o fath wahanol i mewn.

Os yw'r rhwyllen rhuban yn dechrau dod allan o gorn y glust, peidiwch â'i bwyso yn ôl mewn na'i dynnu allan. Defnyddiwch siswrn i dorri'r darn rhydd.

Cyfnod adfer:

Mae'r poen ac anghysur yn tueddu i fod yn ysgafn ac fel arfer mae'n gwella o fewn ychydig ddyddiau. Byddwch yn cael cyngor ar sut i leddfu'r poen cyn i'ch nyrs eich rhyddhau. Mae'r rhan fwyaf o gleifion angen 2-3 wythnos i ffwrdd o'r gwaith ysgol er mwyn gwella. Ni argymhellir codi pethau trwm/rhoi straen o unrhyw fath ar eich corff/gwneud unrhyw ymarfer egnïol yn ystod y cyfnod hwn.

Hedfan:

Ni ddylwch hedfan am 3 mis yn dilyn y llawdriniaeth.

Blasu:

Mae'r nerf blasu yn rhedeg ar draws drwm y glust a gellir ei ymestyn/ei symud/ei dorri er mwyn i'r llawdriniaeth gael ei berfformio. Gall hyn achosi newid yn eich profiad o flas a fydd fel arfer yn sefydlogi o fewn ychydig fisoedd.

Ôl-driniaeth:

Fe ddylech chi gael eich gweld yn y clinig cleifion allanol ymhen tua 3 wythnos wedi'r llawdriniaeth. Ar yr adeg hynny, bydd y pecyn yn cael ei dynnu o gorn y glust a bydd y grafft yn cael ei wirio. Os na fyddwch chi'n derbyn yr apwyntiad hwn, ffoniwch y swyddfa archebu apwyntiad i gleifion allanol ar 01495765055.

GWYBODAETH BRYG I GLAF SYDD WEDI EI RHYDDHAU O'R YSBYTY

09:00 to 17:00 O ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc): Cysylltwch â'r ystafell Triniaeth ENT ar 01633234018

Wedi 17:00/dros nos (oedolion): Ward C0 01633 493926.

Wedi 17:00/dros nos (plant): Ward C1 01633493609.

Os bydd argyfwng, ewch i'ch adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf

"Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English"