



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
University Health Board

Yr Adran Orthopteg

Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio Atropine adeg Profion Golwg Plant Gwybodaeth i gleifion

Mae eich plentyn angen prawf ar gyfer sbectol ac archwiliad manwl o gefn y llygad...

I alluogi'r Offthalmolegydd/ Optometrydd i wneud hyn, mae'n rhaid rhoi diferion Atropine yn llygaid eich plentyn. Bydd yr Atropine yn ymledu canhwylau'r llygaid ac atal ffocysu. Rhaid rhoi'r diferion i mewn ddwy waith y dydd am dri diwrnod cyn apwyntiad eich plentyn.

Pam mae fy mhentyn angen diferion Atropine?

Rhesymau posibl pam maen nhw wedi gofyn i chi roi Atropine yn llygaid eich plentyn:

- Nid oedd y gannwyll wedi ymledu digon gyda diferion Cyclopentolate sy'n cael eu defnyddio fel arfer.
- Mae'n bosibl y bydd gan eich plentyn alergedd i fathau eraill o ddiferion a ddefnyddir.

A oes unrhyw sgil effeithiau?

- Gall y gannwyll barhau i fod wedi ymledu am hyd at 2 wythnos. Mae'r ffocysu'n dod yn ôl yn raddol o fewn 3 diwrnod.
- Tra bod y gannwyll wedi ymledu, ni fydd eich plentyn yn hoffi golau llachar.
- Yn anghyffredin iawn, gellir cael adwaith alergaidd. Gall hyn esgor ar lygaid arbennig o goch, rhai sych neu groen wedi cochi. **Os bydd hyn yn digwydd, peidiwch â defnyddio'r diferion a chysylltwch â'r Clinig Llygaid (01633 238856) neu eich Meddyg Teulu.**

Pwysig!

Os bydd eich plentyn angen unrhyw driniaeth feddygol arall, cofiwch sicrhau bod eich Meddyg/ Deintydd yn gwybod ei fod yn defnyddio Atropine.

Cyfarwyddiadau ar gyfer rhoi diferion yn llygaid plant:

- Storiwch ddiferion Atropine ar dymheredd ystafell ac allan o gyrraedd plant.
- Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl rhoi'r diferion yn y llygad.
- Gyda eich plentyn yn gorwedd lawr, rhowch un diferyn o Atropine ym mhob llygad.
- Dylid rhoi diferion yn llygaid eich plentyn ddwy waith y dydd (bore a nos) am dri diwrnod cyn yr apwyntiad gyda'r Offthalmolegydd/ Optometrydd ond nid ar ddiwrnod yr apwyntiad.

