



GIG  
CYMRU  
NHS  
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol  
Aneurin Bevan  
University Health Board

## Llawdriniaeth Micrograffig Mohs

(Cyfarwyddiadau Cyn  
Llawdriniaeth)

Yr Adran Ddermatoleg

1. Os ydych yn cymryd Aspirin neu Warfarin, rhowch wybod i'ch meddyg neu nyrs os nad ydych wedi cael unrhyw gyfarwyddiadau arbennig eto.
2. Parhewch i fwyta ac yfed fel arfer yn ystod y diwrnodau cyn y llawdriniaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael brecwast ar fore eich llawdriniaeth.
3. Gollwch eich gwallt y noson gynt, neu ar fore'r llawdriniaeth. Efallai na allwch gael cawod am 24-48 awr ar ôl y llawdriniaeth.
4. Gwisgwch ddillad cyffyrddus y gellir eu tynnu'n rhwydd dros eich pen ar ôl y llawdriniaeth.
5. Tynnwch unrhyw golur sydd ar ardal y llawdriniaeth ar ddiwrnod y llawdriniaeth.
6. Trefnwch fod rhywun gyda chi i fynd â chi adref ar ôl y llawdriniaeth. Rydym yn argymhell ichi beidio â bod ar eich pen eich hun y noson gyntaf ar ôl y llawdriniaeth.
7. Osgowch ysmegu am bythefnos cyn ac ar ôl eich llawdriniaeth oherwydd y gall ysmegu amharu'n ddifrifol ar brosesau gwella'r clwyf.
8. Mae rhan helaeth yr amser yn ystod llawdriniaeth Mohs yn cael ei threulio yn aros am brofion labordy a microsgop, felly dewch â rhywbeth i ddarllen os dymunwch. Gallwch ddod â byrbrydau. Gall ffrind neu berthynas aros gyda chi yn ystod y diwrnod.

***Rhowch wybod am unrhyw newidiadau yn eich iechyd cyn y llawdriniaeth i'r meddyg neu'r nyrs.***

**"Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg/  
This document is available in English".**